

بررسی تاثیر عصاره *Ascophyllum nodosum* بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه نخود در شرایط تنش خشکی

راهله احمدپور^۱، اعظم سلیمی^۲، هانیه زیدی^۲، نظام آرمند^۱ و سعیدرضا حسین‌زاده^۳

^۱گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران؛ ^۲گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

^۳گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

مسئول مکاتبات: نظام آرمند، Armand@bkatu.ac.ir

چکیده. در این مطالعه، تأثیر عصاره جلبک دریایی *Ascophyllum nodosum* بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه نخود مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل: عصاره جلبکی در ۴ سطح (۰، ۱/۵، ۲/۵ و ۳/۵ درصد) و تنش خشکی در چهار سطح (۰، ۰/۳، ۰/۶ و ۰/۹ مگاپاسکال) بود. تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ اعمال شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی در سطوح ۰/۶ و ۰/۹ مگاپاسکال به صورت معنی‌داری تمامی صفات مورد بررسی را نسبت به شاهد کاهش داد. سطوح ۲/۵ و ۳/۵ درصد از عصاره جلبک دریایی منجر به افزایش معنی‌دار درصد جوانه‌زنی (۱۸٪ و ۲۴٪)، سرعت جوانه‌زنی (۱۵٪ و ۲۰٪)، طول گیاهچه (۱۳/۳٪ و ۱۵/۷٪)، سطح ریشه‌چه (۱۰/۴٪ و ۱۲/۸٪)، قطر ریشه‌چه (۲۵٪ و ۲۴٪)، طول ساقه‌چه (۱۴٪ و ۱۶٪) و وزن خشک ساقه‌چه (۱۰/۳٪ و ۱۲/۶٪) شد. در شرایط بدون تنش و تنش ۰/۳ مگاپاسکال، سطوح ۲/۵ و ۳/۵ درصد عصاره توانست قدرت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، آندوسپرم مصرفی، طول و وزن خشک ریشه‌چه به صورت معنی‌دار افزایش دهد. در شرایط تنش ۰/۶ مگاپاسکال قدرت جوانه‌زنی، شاخص بنیه، وزن خشک ریشه‌چه و در شرایط تنش ۰/۹ مگاپاسکال آندوسپرم مصرفی، طول و وزن خشک ریشه‌چه با کاربرد عصاره جلبکی در سطح ۳/۵ درصد بهبود یافت. با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از عصاره جلبک دریایی *Ascophyllum nodosum* در مرحله جوانه‌زنی به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش خشکی در گیاه نخود توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی. آندوسپرم مصرفی، پلی اتیلن گلیکول، جلبک قهوه‌ای، کودهای ارگانیک، لگوم

The effects of *Ascophyllum nodosum* extract on the stimulation of germination indices in chickpea (*Cicer arietinum*) under drought stress

Raheleh Ahmadpour¹, Azam Salimi², Haniyeh Zeidi², Nezam Armand¹ and Saeed Reza Hosseinzadeh³

¹Department of Biology, Faculty of Sciences, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Khuzestan, Iran;

²Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran; ³Department of Biology, Faculty of Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran

Corresponding author: Nezam Armand, Armand@bkatu.ac.ir

Abstract. In this study, the effects of seaweed extract (*Ascophyllum nodosum*) on seed germination stimulation and growth indices in chickpea were studied. A factorial experiment was performed on the basis of a completely randomized design with 3 replications. Treatments consisted of seaweed extract at four levels (0, 1.5, 2.5 and 3.5%) and drought stress at four levels (0, -0.3, -0.6 and -0.9 MP). Drought stress was induced by PEG 6000. Results showed that drought stress at -0.6 and -0.9 MP reduced the germination traits significantly compared with the controls. Seaweed extract at 2.5 and 3.5% resulted in a significant increase in the germination percentage (+18%, +24%), germination rate (+15%, +20%), seedling length (+13.3%, +15.7%), radicle area (+10.4%, +12.8%), radicle diameter (+14.2%, +25%), plumule length (+14%, +16.6%) and plumule dry weight (+10.3%, +12.6%). Under non-stress and -0.3 MP, seaweed

extract levels at 2.5 and 3.5% could significantly increase the germination vigor, seed vigor index, consumed endosperm, radicle length and radicle dry weight. The application of seaweed extract at 3.5% improved the germination vigor, seed vigor index and radicle dry weight under -0.6 MP conditions. It also improved the consumed endosperm, length and radicle dry weight in samples affected by -0.9 MP conditions. According to the results, the use of seaweed extract (*Ascophyllum nodosum*) in the seed germination of beans is recommended for the reduction of the negative effects of drought stress.

Keywords. brown algae, consumed endosperm, legumes, organic fertilizers, PEG

مقدمه

نخود (*Cicer arietinum* L.) از جمله مهمترین محصولات زراعی در خاورمیانه و ایران است، که مقدار تولید و کیفیت پروتئین دانه آن بسیار زیاد بوده و هم چنین با تثبیت نیتروژن موجب افزایش حاصلخیزی خاک می شود (Amiri et al., 2017). این گیاه از حبوباتی است که کشت آن در ایران در مناطق نیمه سردسیر به صورت پاییزه و در مناطق مرتفع سردسیر به صورت بهاره و عمدتاً به صورت دیم (۹۲ درصد) و با استفاده از رطوبت ذخیره شده در خاک انجام می شود (Rahbarian et al., 2012). در چنین مناطقی کمبود رطوبت در خاک مهمترین عامل موثر در جهت کاهش خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه است. یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش پارامترهای جوانه زنی نخود، حساسیت بسیار بالای این گیاه به تنش های محیطی به ویژه تنش خشکی در مرحله جوانه زنی است. در این راستا، برخی مطالعات نشان داد که شرایط نامطلوب محیطی از قبیل تنش خشکی منجر به کاهش جوانه زنی بذرهای نخود در حدود ۲۵ درصد می شود (Mensah et al., 2006; Hosseinzadeh et al., 2016). مرحله جوانه زنی در گیاهان ارتباط مستقیم با تولید و عملکرد مناسب گیاهان دارد، به طوری که بسیاری از مطالعات نشان دادند که مرحله جوانه زنی بذرهای مرحله ای حساس است که تراکم، عملکرد و محصول گیاه کشت شده را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین مراحل ابتدایی جوانه زنی، رشد گیاهچه و استقرار آن، بسیار حساس تر از مراحل بعدی هستند (Bibi et al., 2009; Armand et al., 2015). پتانسیل آب محیط، تأثیر مستقیمی بر سرعت جذب آب و در نتیجه جوانه زنی گیاه دارد (Gunes et al., 2006). آب مهمترین عامل در فعال سازی جوانه زنی بذر محسوب شده و کاهش آب قابل دسترس منجر به اختلال در جوانه زنی بذر می شود (Ahmadpour et al., 2016). در شرایط آزمایشگاهی، برای ایجاد محیط های مصنوعی کنترل پتانسیل آب

در محیط های کشت (تنش خشکی) از ماده ای غیر سمی با جرم مولکولی بالا به نام پلی اتیلن گلیکول (PEG) استفاده می شود که مهمترین ویژگی آن این است که در بافت های گیاه نفوذ نمی کند و منجر به آسیب در گیاهان نمی شود (Michael & Kaufman, 1976).

در شرایط تنش خشکی، بالا بردن توانایی جوانه زنی بذرهای کاربرد تیمارهای مناسب در جهت کاهش اثرات منفی تنش، راهکاری مناسب در جهت افزایش رشد و عملکرد گیاه، استقرار مناسب گیاهچه ها و ایجاد یک سیستم ریشه ای قوی است (Hosseinzadeh et al., 2016). بیوپرایمینگ بذر در واقع یک روش نوین و کاربردی است که می تواند در سطح گسترده ای در تحریک جوانه زنی و بهبود یکنواختی رشد گیاهچه ها به کار گرفته شود. در این روش از عوامل زنده و بیولوژیک نظیر عصاره های مختلف جلبکی و قارچی به عنوان پیش تیمار در جهت افزایش خصوصیات جوانه زنی استفاده می شود (Halmer, 2000; Zhang & Ervin, 2004). در بسیاری از مطالعات گزارش شده است که عصاره های جلبک دریایی (*Ascophyllum nodosum*) به دلیل داشتن هورمون های رشد نظیر اکسین، سیتوکینین و ترکیبات ارزشمند دیگر نظیر نمک های معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها تأثیر مفید و مثبتی بر خصوصیات مورفولوژی و جوانه زنی گیاهان دارد (Zhang & Ervin, 2008; Kumar & Sahoo, 2011). در عصاره جلبکی عناصر غذایی مغذی و پر کاربرد نظیر نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و عناصر غذایی کم کاربرد نظیر آهن، روی، مس و منگنز به وفور یافت می شود (Zhang & Ervin, 2004). در یک مطالعه مشاهده شد که تلفیق جلبک ها در محیط های غذایی کشت گیاهان منجر به افزایش معنی دار خصوصیات رشدی گیاه می شود (Caffagni et al., 2015). در مطالعه بر روی گندم مشاهده شد که کاربرد عصاره جلبکی در افزایش معنی دار شاخص های جوانه زنی، رشدی و عملکردی گیاه نقش دارد (Kumar & Sahoo, 2011). در نتایجی مشابه در ارتباط با

اثرات مثبت عصاره جلبک دریایی گزارش شد که استفاده از آن‌ها موجب تأخیر در پیری، تحریک ریشه‌زایی و رشد ریشه می‌گردد (Craigie, 2011).

در چند دهه اخیر، مصرف مواد شیمیایی در اراضی کشاورزی، مشکلات زیست محیطی متعددی از جمله آلودگی منابع آب، آفت کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش میزان حاصل خیزی خاک‌ها را به وجود آورده است. جلبک‌های دریایی و عصاره‌های حاصل از آن‌ها مناسب‌ترین جایگزین برای کودها و قارچ‌کش‌های شیمیایی هستند و در کشاورزی ارگانیک که هدف آن تولید محصولات عاری از مواد شیمیایی است، یکی از بهترین تیمارها محسوب می‌شود. نظر به اینکه نخود محصولی با ارزش اقتصادی به‌شمار می‌رود و مطالعات متعددی نشان داده‌اند که بذرهاى نخود به تنش خشکی حساس هستند، اقدامات لازم جهت افزایش شاخص‌های جوانه‌زنی و در نهایت محصول و عملکرد گیاه ضروری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات عصاره جلبک دریایی (*Ascophyllum nodosum*) بر مهمترین پارامترهای جوانه‌زنی و رشدی گیاه نخود (رقم عادل) در شرایط تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلايکول است که مشخص شود آیا عصاره جلبکی می‌تواند در کاهش اثرات منفی تنش خشکی نقش داشته باشد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در مهرماه سال ۱۳۹۵ در شرایط کنترل شده (ژرمیناتور) انجام شد. عصاره جلبک دریایی (*Ascophyllum nodosum*) به عنوان اولین عامل مورد بررسی در نظر گرفته شد که شامل ۵ سطح صفر، ۱/۵، ۲/۵ و ۳/۵ درصد حجمی بود. عصاره جلبک دریایی (BIOALGAX) با غلظت ۲۵٪ از شرکت همیار دشت آبرون تهیه شد. خصوصیات عصاره جلبک دریایی مورد استفاده بررسی در جدول ۱ ذکر گردیده است.

دومین عامل مورد بررسی سطوح مختلف تنش خشکی (صفر، ۰/۳-، ۰/۶- و ۰/۹- مگاپاسکال) بود که با استفاده از پلی‌اتیلن گلايکول ۶۰۰۰ ایجاد شد (Michael & Kaufman, 1976) و برای پتانسیل صفر بار (شاهد) از آب مقطر استفاده شد. بذر مورد استفاده رقم عادل بود و از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران تهیه شد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش بر مبنای آزمایش‌های مقدماتی و نتایج

تحقیقات سایر محققان انتخاب شد. در ابتدا مجموعه پتری‌دیش‌ها و بستر بذر (کاغذ واتمن) استریل شدند و سپس بذرهاى مورد استفاده به مدت ۳۰ ثانیه با قارچ‌کش بنومیل ۲ در هزار ضدعفونی و سپس با آب مقطر شستشو داده شدند. برای هر تکرار از ۳۰ عدد بذر استفاده شد. به هر واحد آزمایشی که شامل پتری‌دیش و کاغذ صافی استریل بود، ۸ میلی‌لیتر از محلول‌های تهیه شده شامل عصاره جلبکی و تنش خشکی طبق تیمارهای آزمایش افزوده شد. به منظور کاهش تبخیر محلول افزوده شده و رعایت شرایط یکسان برای تمامی تیمارها وزن اولیه آن‌ها ثبت گردید، سپس درب پتری‌ها با پارافیلیم بسته و در ژرمیناتور با دمای ۲۵°C و رطوبت ۴۵ درصد در تاریکی گذاشته شدند (Rahbarian et al., 2012). بازدید از نمونه‌ها به طور روزانه یک‌بار و به مدت ۱۴ روز انجام شد و تعداد بذرهاى جوانه زده (دارای طول ریشه چه ۳ میلی‌متر) ثبت شدند (ISTA, 2009). برداشت پتری-دیش‌ها ۱۵ روز بعد از شروع آزمایش انجام شد (Hossein-zadeh et al., 2016). پس از برداشت، ریشه‌چه و ساقه‌چه از بذر جدا شدند و طول ساقه‌چه و ریشه‌چه به وسیله خط‌کش میلی‌متری اندازه‌گیری شد و از مجموع طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، طول گیاهچه محاسبه شد. به منظور تعیین وزن خشک اندام‌های فوق، ساقه‌چه و ریشه‌چه در آون ۷۰°C به مدت ۴۸ ساعت خشک شده و وزن خشک آن‌ها با ترازوی AND مدل GT-300 ساخت آلمان با دقت ۰/۰۰۱ گرم اندازه‌گیری شد (Ahmadpour et al., 2016). سطح و قطر ریشه چه با استفاده از دستگاه WinRHIZO Pro V ساخت کانادا اندازه‌گیری شد (Regent, Instruments Inc., QC, Canada). به منظور تعیین آندوسپرم مصرفی بذرها، ابتدا وزن ۵ عدد بذر در هر تیمار با استفاده از ترازوی دیجیتال تعیین شد، سپس آن‌ها علامت‌گذاری شده و همراه با دیگر بذرها در پتری‌دیش قرار گرفت و همزمان با خروج ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن بذرهاى جوانه‌زده مورد نظر در هر تیمار تعیین شد. در نهایت میزان آندوسپرم مصرفی بذرها از طریق محاسبه اختلاف وزن آنها قبل و بعد از جوانه‌زنی محاسبه شد (Hossein-zadeh et al., 2016). جدول ۲ روابط محاسباتی مورد استفاده برای تعیین شاخص بنیه بذر، درصد، سرعت و قدرت جوانه‌زنی را نشان می‌دهد.

داده‌ها پس از جمع‌آوری و تبدیل توسط نرم افزار MSTAT-C تجزیه واریانس شدند و میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج

پارامترهای سنجش جوانه‌زنی بذر

خشکی نشان داد که با افزایش سطوح خشکی از ۰ به ۰/۹- مگاپاسکال سرعت و درصد جوانه‌زنی کاهش معنی‌داری دارد (جدول ۶). با توجه به جدول ۵ نتایج نشان داد که کاربرد عصاره جلبکی در سطوح ۲/۵ و ۳/۵ درصد منجر به افزایش معنی‌دار سرعت جوانه‌زنی در مقایسه با شاهد و سطح ۱/۵ درصد شد. نتایج تجزیه واریانس (جدول ۳) نشان داد که علاوه بر اثرات ساده تیمارها، اثرات متقابل تنش خشکی و عصاره جلبکی نیز بر قدرت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر و آندوسپرم مصرفی بذره‌های گیاه نخود معنی‌دار بود ($p \leq 0.01$). نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل بر قدرت جوانه‌زنی نشان داد که در شرایط بدون تنش خشکی، سطوح ۲/۵ و ۳/۵ درصد منجر به افزایش معنی‌دار این صفت در

نتایج آنالیز واریانس داده‌ها نشان داد که تنش خشکی و عصاره جلبک دریایی هرکدام به تنهایی تأثیر معنی‌داری بر میزان درصد و سرعت جوانه‌زنی داشت اما اثرات متقابل تنش و عصاره بر این صفت معنی‌دار نبود (جدول ۳). مقایسه میانگین داده‌ها در اثرات ساده عصاره جلبکی بر درصد جوانه‌زنی نشان داد که تمامی سطوح عصاره جلبکی (۱/۵، ۲/۵ و ۳/۵ درصد) منجر به افزایش معنی‌دار درصد جوانه‌زنی در مقایسه با شاهد شد که در این بین سطح ۳/۵ درصد با ۵۶/۹۵ درصد بیشترین میزان درصد جوانه‌زنی را داشت که در مقایسه با سطوح شاهد و ۱/۵ درصد افزایش معنی‌داری داشت (جدول ۵). نتایج مقایسه میانگین‌ها در اثرات ساده تنش

جدول ۱- برخی خصوصیات عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم.

Table 1. Some properties of *Ascophyllum nodosum* seaweed extract.

نمونه Sampele	هدایت الکتریکی EC (ds m ⁻¹)	اسیدیته pH	فولویک اسید FA (%)	فسفر P (%)	کلسیم Ca (%)	پتاسیم K (%)	آهن Fe (%)	نیتروژن کل Total N (%)	چگالی نسبی Relative density (g/cc)	ماده آلی Organic matter (%)
عصاره جلبکی Seaweed extract	1.3	9.2	10.5	1	0.18	16.9	0.5	2.5	1.28	15

جدول ۲- روابط محاسباتی شاخص‌های جوانه‌زنی.

Table 2. Computational relationships of germination indices.

شماره Number	شاخص Index	معادله Equation	منابع مورد استفاده References
(1)	درصد جوانه‌زنی Germination percent	$GP\% = \sum \frac{ni}{N} \times 100$	(Agrawal, 1991)
(2)	سرعت جوانه‌زنی Germination speed	$GS = \sum \frac{ni}{ti}$	(Agrawal, 1991)
(3)	بنیه جوانه‌زنی Germination vigor	$GV = \frac{GR \times \text{mean}(PL + RL)}{100}$	(ISTA, 2009)
(4)	شاخص بنیه بذر Seed vigor index	$SV = \frac{GP \times \text{mean}(PL + RL)}{100}$	(ISTA, 2009)

n = کل بذر جوانه زده طی دوره، ni = تعداد بذره‌های جوانه زده در یک فاصله زمانی مشخص، ti = تعداد روزهای پس از شروع جوانه زنی، N = تعداد بذره‌های کاشته شده، PL = طول ساقه چه، RL = طول ریشه چه.

n= The whole seed germinated, ni= The number of germinated seeds at a given time interval, ti= Number of days after starting germination, N= Number of sown seeds, PL= Plumule length, RL= Radicle length.

جدول ۳- نتایج تجزیه واریانس شاخص‌های جوانه‌زنی بذر نخود در سطوح مختلف عصاره جلبکی تحت تنش خشکی.**Table 3.** Analysis of variance of chickpea germination parameters at different levels of seaweed extract under drought stress.

منابع تغییر S.O.V	درجه آزادی df	درصد جوانه‌زنی Germination percent	سرعت جوانه‌زنی Germination speed	قدرت جوانه‌زنی Germination vigor	شاخص بنیه بذر Seed vigor index	آندوسپرم مصرفی Consumed endosperm	طول گیاهچه Seedling length
عصاره جلبکی Seaweed extract	3	10677.328**	2.883**	0.011**	29.564**	0.004**	22.705**
تنش خشکی Drought stress	3	385.606**	0.151**	0.0003**	1.074**	0.0002**	0.609**
عصاره × تنش Extract × Stress	9	30.853 ^{ns}	0.008 ^{ns}	0.0001**	0.201**	0.0005**	0.040**
خطای آزمایش Error	32	16.144	0.006	0.0004	0.022	0.00001	0.051
ضریب تغییرات (/) CV	-	7.93	7.68	6.06	7.86	9.02	7.35

ns, **, * به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد.

ns, *, **: non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

در اثرات ساده عصاره نشان داد که تمامی سطوح عصاره جلبکی شامل ۱/۵، ۲/۵ و ۳/۵ درصد به ترتیب با ۳/۱۰، ۳/۱۸ و ۳/۲۸ سانتی‌متر منجر به افزایش معنی‌دار طول گیاهچه در مقایسه با شاهد شد (جدول ۵). جدول ۶ نشان می‌دهد که با افزایش شدت تنش خشکی، طول گیاهچه به صورت معنی‌داری کاهش می‌یابد. در مقایسه بین تیمارهای عصاره جلبکی مشاهده شد که تمامی سطوح عصاره مورد بررسی در یک گروه آماری و سطح شاهد در گروه آماری جداگانه‌ای قرار گرفت به‌طوری‌که استفاده از عصاره جلبکی منجر به افزایش معنی‌دار طول ساقه‌چه در تمامی سطوح شد (جدول ۵). در بررسی تیمارهای تنش خشکی، بیشترین و کمترین طول ساقه‌چه به ترتیب در سطوح صفر و ۰/۹- مگاپاسکال مشاهده شد که در مقایسه با یکدیگر تنش خشکی منجر به کاهش معنی‌دار این صفت شد (جدول ۶). مقایسه میانگین داده‌ها (جدول ۵) در کاربرد عصاره جلبک دریایی بر وزن خشک ساقه‌چه نشان داد که سطح ۱/۵ درصد از عصاره با سطح شاهد اختلاف معنی‌داری ندارد اما سطوح ۲/۵ و ۳/۵ درصد منجر به افزایش معنی‌دار وزن خشک ساقه‌چه در مقایسه با شاهد شد (جدول ۵). در بین تیمارهای تنش خشکی مشاهده شد که شرایط بدون تنش خشکی بیشترین میزان وزن خشک ساقه‌چه را داشت و به ترتیب با افزایش سطوح تنش این صفت کاهش معنی‌داری دارد (جدول ۶).

پارامترهای رشدی مرتبط با ریشه‌چه

نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تنش خشکی، عصاره جلبکی و اثرات متقابل این دو تیمار بر طول ریشه‌چه و وزن خشک

مقایسه با شاهد شد اما در شرایط تنش خشکی ۰/۹- مگاپاسکال اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای عصاره مشاهده نشد. در شرایط تنش ۰/۳- و ۰/۶- مگاپاسکال، استفاده از عصاره جلبکی در سطح ۲/۵ درصد بسیار موثر بود به‌طوری‌که منجر به افزایش معنی‌دار قدرت جوانه‌زنی در مقایسه با سطوح شاهد شد (جدول ۷). مقایسه میانگین داده‌های حاصل از شاخص بنیه بذر نشان داد که در شرایط بدون تنش و تنش ۰/۳- مگاپاسکال، تمامی سطوح عصاره جلبکی مورد استفاده به صورت معنی‌داری در مقایسه با سطوح شاهد این شاخص را افزایش دادند اما در شرایط تنش ۰/۶- مگاپاسکال تنها سطح ۲/۵ درصد از عصاره توانست به صورت معنی‌داری شاخص بنیه بذر را افزایش دهد. در شرایط تنش ۰/۹- مگاپاسکال تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای عصاره جلبکی مشاهده نشد (جدول ۷). کاربرد عصاره جلبکی در تمامی سطوح منجر به افزایش معنی‌دار میزان آندوسپرم مصرفی در شرایط بدون تنش شد اما در شرایط تنش ۰/۳- و ۰/۹- مگاپاسکال، سطح ۲/۵ درصد از عصاره جلبکی بسیار موثر بود و در مقایسه با سطوح شاهد افزایش معنی‌داری داشت. در شرایط تنش خشکی ۰/۶- مگاپاسکال اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای عصاره وجود نداشت (جدول ۷).

پارامترهای رشدی مرتبط با گیاهچه

تجزیه واریانس داده‌های مرتبط با طول ساقه‌چه، طول گیاهچه و وزن خشک ساقه‌چه نشان داد که تأثیر عصاره جلبک دریایی و تنش خشکی بر این صفات معنی‌دار ($p \leq 0.01$) است اما اثرات متقابل این تیمارها معنی‌دار نبود (جدول ۴). مقایسه میانگین داده‌ها

ریشه‌چه معنی‌دار است (جدول ۴). مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل تنش و عصاره بر طول ریشه‌چه نشان داد که در شرایط بدون تنش، تنش ۰/۳- و ۰/۹- مگاپاسکال، کاربرد عصاره جلبکی در تمامی سطوح منجر به افزایش معنی‌دار طول ریشه‌چه شد اما در شرایط تنش ۰/۶- مگاپاسکال اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای عصاره وجود نداشت (جدول ۷). نتایج مقایسه میانگین‌های مرتبط با وزن خشک ریشه‌چه نشان داد که در تمامی سطوح تنش خشکی مورد بررسی (۰، ۰/۳، ۰/۶، ۰/۹- مگاپاسکال) کاربرد عصاره جلبکی به‌خصوص در سطوح ۲/۵ و ۳/۵ درصد منجر به افزایش معنی‌دار وزن خشک ریشه‌چه در مقایسه با سطوح شاهد شد (جدول ۷). آنالیز واریانس داده‌ها (جدول ۴) نشان داد که تنش خشکی و کاربرد عصاره جلبک دریایی تأثیر معنی‌داری ($p \leq 0.01$) بر میزان قطر و سطح ریشه‌چه داشت اما اثرات متقابل

بر این صفت معنی‌دار نبود (جدول ۴). در بررسی داده‌های حاصل از سطح ریشه‌چه، مقایسه میانگین‌ها در اثرات ساده عصاره جلبکی نشان داد که سطوح ۲/۵ و ۳/۵ درصد منجر به افزایش معنی‌دار این صفت در مقایسه با شاهد شد. سطح ۱/۵ درصد از عصاره جلبکی با سطح شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت (جدول ۵). در بین سطوح تنش، شرایط بدون تنش خشکی بیشترین میزان سطح ریشه‌چه داشت که در مقایسه با دیگر سطوح این افزایش معنی‌دار بود اما کمترین میزان این صفت نیز به سطح ۰/۹- مگاپاسکال اختصاص داشت که نسبت به دیگر سطوح نیز این کاهش معنی‌دار بود (جدول ۶). در مقایسه سطوح مختلف عصاره جلبکی مورد بررسی، نتایج نشان داد که سطح ۳/۵ درصد به صورت معنی‌داری نسبت به شاهد قطر ریشه‌چه را افزایش داد اما کاربرد عصاره جلبک دریایی در سطوح ۱/۵ و ۲/۵ درصد تفاوت معنی‌داری از لحاظ قطر ریشه‌چه

جدول ۴- نتایج تجزیه واریانس شاخص‌های رشد گیاهچه نخود در سطوح مختلف عصاره جلبکی تحت تنش خشکی.

Table 4. Analysis of variance of chickpea seedling growth indices at different levels of seaweed extract under drought stress.

منابع تغییر S.O.V	درجه آزادی df	طول ساقه‌چه Plumule length	وزن خشک ساقه‌چه Plumule dry weight	طول ریشه‌چه Radicle length	وزن خشک ریشه‌چه Radicle dry weight	سطح ریشه‌چه Radicle area	قطر ریشه‌چه Radicle diameter
Mean Square							
عصاره جلبکی Seaweed extract	3	4.872**	0.017**	6.787**	0.051**	0.016**	0.0005**
تنش خشکی Drought stress	3	0.138**	0.0006**	0.168**	0.001**	0.001**	0.0001**
عصاره × تنش × Extract Stress	9	0.007 ^{ns}	0.0004 ^{ns}	0.016**	0.0003**	0.0003 ^{ns}	0.0002**
خطای آزمایش Error	32	0.009	0.00003	0.019	0.0001	0.00001	0.0001
ضریب تغییرات (%) CV	-	6.81	7.50	8.15	7.94	9.02	11.69

^{ns}, **, * به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد.

^{ns}, **, *: non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

جدول ۵- مقایسه میانگین شاخص‌های جوانه‌زنی بذر نخود در سطوح مختلف عصاره جلبکی.

Table 5. Mean Comparison of chickpea germination indices at different levels of seaweed extract.

تیمارها Treatm ents	درصد جوانه‌زنی Germination percent (%)	سرعت جوانه‌زنی Germination speed (بذر در روز)	طول ساقه‌چه Plumule length (cm)	وزن خشک ساقه‌چه Plumule dry weight (g)	طول گیاهچه Seedling length (cm)	سطح ریشه‌چه Radicle area (mm ²)	قطر ریشه‌چه Radicle diameter (mm)
Seaweed extract / عصاره جلبک دریایی							
0	43.77 c	1.009 b	1.234 b	1.069 c	2.765 b	0.129 b	0.012 b
1.5%	48.87 b	1.076 b	1.382 a	1.072 bc	3.108 a	0.140 ab	0.013 ab
2.5%	53.14 ab	1.185 a	1.435 a	1.077 ab	3.189 a	0.144 a	0.014 ab
3.5%	65.95 a	1.261 a	1.481 a	1.079 a	3.281 a	0.148 a	0.016 a

در هر ستون میانگین‌هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک می‌باشند مطابق آزمون چنددامنه‌ای دانکن اختلاف معنی‌داری ندارند.

The means with one same letter in each column are not significantly differences according to Duncan's test.

جدول ۶- مقایسه میانگین شاخص‌های جوانه‌زنی بذر نخود در سطوح مختلف تنش خشکی.

Table 6. Mean Comparison of chickpea germination indices at different levels of drought stress.

تیمارها Treatment s	درصد جوانه‌زنی Germination percent (%)	سرعت جوانه‌زنی Germination speed (بذر در روز)	طول ساقچه Plumule length (cm)	وزن خشک ساقچه Plumule dry weight (g)	طول گیاهچه Seedling length (cm)	سطح ریشه‌چه Radicle area (mm ²)	قطر ریشه‌چه Radicle diameter (mm)
تنش خشکی/Drought stress							
0	82.65 a	1.715 a	2.076 a	0.115 a	4.606 a	0.208 a	0.020 a
-0.3 MP	63.18 b	1.256 b	1.613 b	0.095 b	3.724 b	0.180 b	0.016 b
-0.6 MP	44.31 c	1.023 c	1.281 c	0.056 c	3.568 c	0.107 c	0.011 c
-0.9 MP	12.59 d	0.537 d	0.561 d	0.032 d	1.446 d	0.066 d	0.008 c

در هر ستون میانگین‌هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک می‌باشند مطابق آزمون چنددامنه‌ای دانکن اختلاف معنی‌داری ندارند.

The means with one same letter in each column are not significantly differences according to Duncan's test.

جدول ۷- مقایسه میانگین شاخص‌های جوانه‌زنی و رشدی بذرهای نخود تحت تأثیر سطوح مختلف عصاره جلبکی و تنش خشکی.

Table 7. Mean Comparison of chickpea germination characteristics at different levels of seaweed extract and drought stress.

تیمارها/عصاره جلبکی Treatments/ seaweed extract	قدرت جوانه‌زنی Germination vigor	شاخص بیه بذر Seed vigor index	آندوسپرم مصرفی Consumed endosperm (g)	طول ریشه‌چه Radicle length (cm)	وزن خشک ریشه‌چه Radicle dry weight (g)
بدون تنش خشکی/Non stress					
0	0.065 cd	3.043 c	0.044 c	4.16 b	2.31 c
1.5%	0.074 bc	3.690 b	0.055 b	4.68 a	2.58 b
2.5%	0.083 ab	4 b	0.060 b	4.72 a	2.56 b
3.5%	0.091 a	4.547 a	0.066 a	4.85 a	2.66 a
-0.3 MP / -۰/۳ مگاپاسکال					
0	0.039 ef	1.857 e	0.030 d	3.45 e	1.96 g
1.5%	0.044 e	2.350 d	0.034 d	3.69 d	2.08 f
2.5%	0.048 e	2.553 d	0.043 c	3.81 cd	2.17 e
3.5%	0.053 d	2.690 d	0.045 c	3.94 bc	2.22 d
-0.6 MP / -۰/۶ مگاپاسکال					
0	0.022 ghi	0.980 g	0.018 ef	2.46 f	1.24 j
1.5%	0.025 fgh	1.010 fg	0.019 ef	2.54 f	1.29 i
2.5%	0.027 fg	1.213 fg	0.019 ef	2.60 f	1.28 i
3.5%	0.033 f	1.343 f	0.021 e	2.66 f	1.32 h
-0.9 MP / -۰/۹ مگاپاسکال					
0	0.005 j	0.123 h	0.009 g	0.98 h	0.600 m
1.5%	0.007 j	0.193 h	0.014 fg	1.51 g	0.946 l
2.5%	0.009 ij	0.213 h	0.013 fg	1.62 g	0.986 k
3.5%	0.011 hij	0.246 h	0.015 f	1.66 g	0.996 k

در هر ستون میانگین‌هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک می‌باشند مطابق آزمون چنددامنه‌ای دانکن اختلاف معنی‌داری ندارند.

The means with one same letter in each column are not significantly differences according to Duncan's test.

با سطح شاهد نداشت (جدول ۵). جدول ۶ نشان می‌دهد که تنش خشکی در سطوح -۰/۹ و -۰/۶ مگاپاسکال در مقایسه با دیگر سطوح موجب کاهش معنی‌دار قطر ریشه‌چه شد اما در مقایسه با یکدیگر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. شرایط بدون تنش خشکی بیشترین میزان قطر ریشه‌چه را داشت که نسبت به تمامی سطوح افزایش معنی‌داری داشت (جدول ۶).

بحث

پارامترهای سنجش جوانه‌زنی بذر. خصوصياتی نظیر درصد، سرعت و قدرت جوانه‌زنی بذر از مهمترین پارامترهای سنجش کیفیت بذر محسوب شده و افزایش این خصوصیات در شرایط تنش خشکی منجر به افزایش رشد و عملکرد گیاه، استقرار مناسب گیاهچه‌ها و ایجاد یک سیستم ریشه‌ای قوی می‌شود (Zakaria et al., 2009). مطالعات متعدد در این زمینه نشان داده‌اند که این صفات در ارزیابی تحمل به تنش خشکی نقش دارند، به‌طوری‌که بذرهایی با درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، قدرت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر بالاتر در شرایط تنش خشکی، از شانس بیشتری برای رشد برخوردار هستند و به عنوان ارقام مقاوم‌تر معرفی می‌شوند (Kalefetoglu et al., 2009; Ahmadpour et al., 2016).
بروز تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی با کاهش پتانسیل آب در بستر بذر همراه است که پیامد آن کاهش شاخص بنیه بذر، آندوسپرم مصرفی، سرعت و درصد جوانه‌زنی است. تنش خشکی همراه با کاهش هدایت هیدرولیکی و تخریب ساختمان سه بعدی آنزیم‌ها (به خصوص آلفا-آمیلاز) است که در نهایت کاهش معنی-دار فرآیندهای فیزیولوژیکی و متابولیکی بذر را به دنبال دارد (Rahbarian et al., 2012). در یک بررسی بر روی ارقام گیاه نخود مشاهده شد که با کاهش پتانسیل اسمزی آب در بستر بذر مدت زمان لازم برای خروج ریشه‌چه از بذر افزایش یافته و موجب کاهش سرعت و درصد جوانه‌زنی می‌شود (Hossein-zadeh et al., 2016). قدرت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر ارتباط مستقیم با طول ساقه‌چه، طول ریشه‌چه، سرعت جوانه‌زنی و درصد جوانه‌زنی دارند (ISTA, 2009). بنابراین کاهش شاخص بنیه بذر و قدرت جوانه‌زنی در سطوح تنش خشکی را نسبت به سطح بدون تنش می-توان به کاهش معنی‌دار سرعت و درصد جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و طول ریشه‌چه در این سطوح نسبت داد. نتایج این مطالعه همسو با نتایج سایر محققان (Kafi et al., 2005; Rahbarian et al., 2012; Ahmadpour et al., 2016) نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی (از ۰/۳- تا ۰/۹-) مگاپاسکال) پارامترهای جوانه‌زنی مورد بررسی شامل درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، قدرت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر و آندوسپرم مصرفی به صورت معنی-داری کاهش می‌یابد. عصاره جلبک دریایی (*Ascophyllum*

nodosum) با داشتن ترکیباتی نظیر عناصر غذایی کم مصرف (Fe, Mn, Cu, Zn) و پرمصرف (Mg, Ca, K, N) نقش مهمی در تنظیم اسمزی محیط اطراف بذر (با کاهش پتانسیل اسمزی محیط و حفظ آب قابل دسترس)، تغذیه بذر و فعال‌سازی برخی فرآیندهای بیوشیمیایی (به عنوان کوفاکتور برای برخی آنزیم‌ها) دارند (Zhang & Ervin, 2004). علاوه بر عناصر مغذی در مطالعات متعددی گزارش شده است که عصاره جلبک‌های قهوه‌ای (*Phaeophyceae*) غنی از هورمون‌های گیاهی نظیر اکسین، ژیرلین و سیتوکینین هستند (Craigie, 2011). سیتوکینین‌ها ارتباط مستقیم با افزایش تقسیم سلولی در بذر و فعال‌سازی آنزیم آلفا-آمیلاز دارند که می‌تواند منجر به افزایش سرعت و درصد جوانه‌زنی گردد (Craigie, 2011). از طرف دیگر ژیرلین و اکسین موجود در عصاره جلبکی موجب شکست خواب بذر، تحریک رشد گیاهچه (ساقه‌چه+ریشه‌چه) و استقرار مناسب جوانه در خاک می-شود (David, 2010). با توجه به ارتباط مستقیم شاخص بنیه بذر و قدرت جوانه‌زنی با طول گیاهچه بنابراین می‌توان گفت افزایش این پارامترها نیز با افزایش طول گیاهچه در تیمارهای عصاره جلبکی مورد بررسی متناسب است. در یک مطالعه مشاهده شد که استفاده از عصاره‌های جلبکی به عنوان پیش‌تیمار بذر موجب افزایش خصوصیات جوانه‌زنی (درصد، سرعت و قدرت جوانه‌زنی) و فعالیت آنزیم آلفا و بتا آمیلاز شد. این محققان علت را افزایش ترکیبات هورمونی، عناصر معدنی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی با کاربرد عصاره جلبکی بیان کردند (Ghannad et al., 2017). آلفا آمیلاز قادر است با اتصال به باندهای گلیکوزیدی آمیلوز (پلی ساکارید ذخیره‌ای در بذره‌ای گیاهان) در تجزیه نشاسته و تأمین انرژی مورد نیاز برای فرآیندهای جوانه‌زنی نقش داشته باشد (Farooq et al., 2007). آندوسپرم مصرفی پارامتری است که نشان‌دهنده استفاده جوانه ایجاد شده از مواد غذایی ذخیره شده در بذر است (Ahmadpour et al., 2016). با توجه به اینکه جوانه حاصل از بذر فاقد برگ‌های اولیه به منظور تأمین مواد غذایی از طریق فتوسنتز است، به این منظور ذخایر آندوسپرم داخل بذر مهمترین منبع تغذیه‌ای به شمار می‌آید (Kafi et al., 2005). در یک مطالعه بر روی ژنوتیپ‌های نخود مقاوم و حساس به تنش خشکی مشاهده شد که در سطوح تنش خشکی بالا (۰/۶- و ۰/۹- مگاپاسکال) به دلیل کاهش درصد نهایی جوانه‌زنی، کاهش رشد ساقه‌چه و ریشه‌چه مصرف آندوسپرم کاهش

یافت (Rahbarian et al., 2012). عصاره جلبک دریایی (*Ascophyllum nodosum*) با افزایش فعالیت آنزیم‌های تجزیه‌کننده آندوسپرم به‌ویژه آلفا و بتا آمیلاز منجر به افزایش دسترسی بذر به منابع غذایی می‌گردد (Kumar & Sahoo, 2011) و در نتیجه برداشت مواد غذایی از اندوسپرم به منظور تأمین انرژی برای پارامترهای جوانه‌زنی و رشدی افزایش می‌یابد که در نهایت این رویداد موجب افزایش اندوسپرم مصرفی می‌گردد (Hosseinzadeh et al., 2016).

پارامترهای رشدی مرتبط با گیاهچه. مکانیسم‌های مرتبط با رشد طولی گیاهچه و ساقه‌چه در مرحله جوانه‌زنی به کمبود آب قابل دسترس برای بذر حساس‌اند به‌طوری‌که در شرایط تنش خشکی برخی از این فرآیندها نظیر انبساط و طولیل شدن سلول‌ها، سنتز کربوهیدرات‌های دیواره سلولی، تولید مواد غذایی و هورمونی مورد نیاز برای توسعه سلول با کاهش معنی‌دار مواجه می‌شوند (Hosseinzadeh et al., 2016). در یک مطالعه بر روی ارقام گیاه نخود علت کاهش طول ساقه‌چه و گیاهچه در شدت‌های پایین تنش خشکی، کاهش انتقال مواد غذایی به محور زیرلپه (هیپوکوتیل) و در شدت‌های بالاتر، با غیرفعال شدن آنزیم‌های تجزیه‌کننده (آلفا و بتا آمیلاز)، عدم تولید و انتقال مواد غذایی مورد نیاز برای رشد طولی گزارش شد (Rahbarian et al., 2012). نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از عصاره جلبک دریایی (*Ascophyllum nodosum*) منجر به افزایش معنی‌دار رشد طولی گیاهچه و ساقه‌چه شد (جدول ۵). جلبک *Ascophyllum nodosum* در بخش ساقه دارای ساختارهای تخم مرغی شکل (ویزیکول) متعددی است که این بخش‌ها غنی از هورمون‌های گیاهی نظیر اکسین و سیتوکینین، اسیدهای آلی، کربوهیدرات‌ها و عناصر معدنی هستند (Jannin et al., 2013). در فرآیند خالص‌سازی عصاره این جلبک، ترکیبات موجود در وزیکول‌ها بدون هیچگونه تغییر همراه با شیره سلولی استخراج می‌شوند (Jannin et al., 2013). بنابراین، با توجه به مقادیر بالای عناصر مغذی و هورمون‌های گیاهی به‌ویژه اکسین و سیتوکینین در عصاره جلبک *Ascophyllum nodosum* افزایش طولی گیاهچه و ساقه‌چه بذرهای نخود به دلیل تغذیه مستقیم از این ترکیبات و فعالیت اکسین قابل پیش‌بینی است (Ramarajan et al., 2012). تجمع ماده خشک و رشد طولی ساقه‌چه همبستگی مثبت و بسیار بالایی با یکدیگر دارند، به‌طوری‌که افزایش طول ساقه‌چه

موجب افزایش معنی‌دار وزن خشک ساقه‌چه می‌گردد (Ahmadpour et al., 2016). تحرک کم مواد غذایی و انتقال کمتر این مواد از لپه به محور جنینی دلیل اصلی کاهش وزن خشک ساقه‌چه در پتانسیل‌های آب پایین (تنش خشکی) است (Bibi et al., 2009). در مطالعات مشابه بر روی لوبیا و نخود نیز محققان علت کاهش معنی‌دار وزن خشک ساقه‌چه را در شرایط تنش خشکی به کاهش شدید رشد طولی ساقه‌چه نسبت دادند (Rahbarian et al., 2012; Armand et al., 2015). در حالت کلی افزایش وزن خشک ساقه‌چه در سطوح عصاره جلبکی (۱/۵، ۲/۵ و ۳/۵ درصد) در این مطالعه را می‌توان با افزایش طول ساقه‌چه و گیاهچه در این سطوح مرتبط دانست. کاربرد عصاره جلبکی بر روی بذرهای سویا و برنج موجب افزایش معنی‌دار شاخص‌های رشدی نظیر طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه شد. این محققان گزارش کردند که هورمون‌های گیاهی موجود در عصاره‌های جلبکی (اکسین و سیتوکینین) عامل اصلی در افزایش معنی‌دار رشد طولی و وزن خشک گیاهچه هستند (Ramarajan et al., 2012; Kord Firouzjaji et al., 2012).

پارامترهای رشدی مرتبط با ریشه‌چه. ریشه‌چه قبل از اندام‌های دیگر از بذر خارج شده و در نتیجه قبل از اندام‌های دیگر در معرض تنش‌های محیطی قرار می‌گیرند، بنابراین صفات مورفولوژیک ریشه نظیر طول، سطح، حجم، قطر و وزن خشک ریشه‌چه معیارهای مناسبی در جهت گزینش ارقام متحمل به تنش خشکی می‌باشند (Mensah et al., 2006; Ahmadpour et al., 2016). پلی‌اتیلن‌گلایکول با از دسترس خارج نمودن آب مورد نیاز بذر و ایجاد تنش خشکی منجر به کاهش فرآیندهای فیزیولوژیک و متابولیک جوانه‌زنی شده که این رویداد در نهایت با کاهش رشد ریشه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه و سطح ریشه‌چه همراه است (Ahmadpour et al., 2016). این مطلب توسط سایر محققین نیز گزارش شده است (Khalid et al., 2001; Gamze et al., 2005). در شرایط تنش خشکی، تغییرات فشار آماس در سلول‌های ریشه‌چه در توقف رشد طولی آن‌ها نقش بسزایی دارد، به‌طوری‌که با کمبود آب پیوندهای موجود در دیواره سلول‌های ریشه‌چه سخت‌تر شده و در نتیجه توسعه‌پذیری، رشد طولی و تجمع ماده خشک ریشه‌چه محدود می‌شود (Hosseinzadeh et al., 2016). برخی محققان نیز علت کاهش خصوصیات رشدی ریشه‌چه حبوبات

نتیجه گیری

عصاره جلبک دریایی با خصوصیات مفید فراوان نظیر مواد مغذی، پلی ساکارید، پروتئین و تنظیم کننده های رشد گیاهی توانست، موجب افزایش معنی دار صفاتی نظیر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه، سطح ریشه چه، قطر ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ساقه چه در مقایسه با سطح بدون استفاده از عصاره جلبکی شود. تنش خشکی در تمامی سطوح (۰/۳، ۰/۶ و ۰/۹ - مگاپاسکال) موجب کاهش معنی دار کلیه صفات مورد بررسی در مقایسه با شرایط بدون تنش شد اما کاربرد عصاره جلبکی به ویژه در سطح ۳/۵ درصد منجر به افزایش معنی دار قدرت جوانه زنی، شاخص بنیه بذری، آندوسپرم مصرفی، طول و وزن خشک ریشه چه شد و کاهش اثرات منفی ناشی از تنش شد. با توجه به توسعه کاشت دیم نخود در بخش هایی از کشور، کاربرد عصاره جلبک دریایی (*Ascohyllum nodosum*) در خاک می تواند در بهبود شاخص های جوانه زنی، خصوصیات رشدی و استقرار مناسب گیاهچه نقش مهمی ایفا کند و باعث افزایش عملکرد این گیاه گردد.

سپاسگزاری

از دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء به خاطر پشتیبانی های مالی در اجرای این پروژه قدردانی می شود.

REFERENCES

- Agrawal, R.L. 1991. Seed technology. Oxford and IBH Publishing. 658 pp.
- Ahmadpour, R., Armand, N., Hosseinzadeh, S.R and Chashiani, S. 2016. Selection drought tolerant cultivars of lentil (*Lens culinaris* Medik.) by measuring germination parameters. – Iranian J. Seed Sci. Res. 3: 75-88.
- Amiri, H., Ismaili, A. and Hosseinzadeh, S.R. 2017. Influence of vermicompost fertilizer and water deficit stress on morpho-physiological features of chickpea (*Cicer arietinum* L. cv. karaj). – Compost Sci. Utili. 25: 152-165.
- Armand, N., Amiri, H. and Ismaili, A. 2015. Effect of methanol on germination characteristics of bean (*Phaseolus vulgaris* L. cv. Sadry) under drought stress condition. – J. Puls. Res. 6: 42-53.
- Bibi N., Hamed, A. and Ali, H. 2009. Water stress induced variations in protein profiles of germinating cotyledons from seedlings of chickpea genotypes. – Pakistan J. Bot. 41: 731-736.
- Caffagni, D.E., Camargo, E., Casali, C.A., Lombardi, A.T. and Lima, M.I.S. 2015. Coupling microalgal cultures with hydroponics: Prospection for clean biotechnology processes. – J. Algal. Biomass. Util. 6: 88-94.

(نخود، لوبیا و عدس) را در شرایط تنش خشکی، تأخیر در انتقال پروتئین، پلی ساکارید و سایر ترکیبات مغذی از آندوسپرم به محور جنینی بیان کردند (Rahbarian et al., 2012; Armand et al., 2016; Ahmadpour et al., 2015). در تأیید این فرضیه در آزمایشی بر روی گندم مشاهده شد، مکانیسم هایی که بر تحرک مواد غذایی و انتقال آنها از لپه ها به محور جنینی موثر باشند، در کاهش معنی دار طول، سطح و وزن خشک ریشه چه نقش دارند. نتایج این پژوهش همسو با مطالعات فوق نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی دار خصوصیات مرتبط با ریشه چه شد. یکی از راهبردهای مقاومت به تنش خشکی در جوانه های حاصل از بذری، اختصاص بیشتر مواد غذایی ذخیره ای به ریشه چه است تا رشد آن محدود نگردد (Fabian et al., 2008). افزایش شاخص های مورفولوژی ریشه چه از قبیل طول، سطح، قطر و حجم ریشه چه با توجه به اینکه می تواند در آینده به بهره برداری گیاه از رطوبت و عناصر غذایی موجود در خاک کمک کنند، بنابراین نقش بسزایی در بهبود شرایط تنش و استقرار مناسب در خاک دارد (Ahmadpour et al., 2016). همانطور که در بخش های قبلی نیز اشاره شد، از مهمترین مزایای عصاره جلبک دریایی *Ascohyllum nodosum* مقادیر بالای عناصر مغذی، پلی ساکارید، پروتئین و هورمون های گیاهی است که در تغذیه مستقیم بذرها و گیاهان نقش دارند و از طریق بهبود طول، سطح و حجم ریشه چه در شرایط تنش خشکی موجب افزایش معنی دار وزن خشک ریشه چه می شود (Zhang & Ervin, 2004; Ramarajan et al., 2012). در آزمایشی بر روی سویا مشاهده شد که پرایمینگ بذرها با عصاره جلبکی موجب افزایش معنی دار شاخص های جوانه زنی و پارامترهای رشدی جوانه ها شد (Ramarajan et al., 2012). یکی از ترکیبات موجود در عصاره جلبک دریایی (*Ascohyllum nodosum*) آلجیناز است که از مهمترین ویژگی های آن نقش مستقیم در ژله ای شدن دیواره سلولی و افزایش توسعه پذیری است، بنابراین استفاده از عصاره جلبکی در شرایط تنش خشکی می تواند منجر به کاهش اثرات منفی آن در جهت سخت شدن دیواره سلولی و کاهش رشد طولی گردد (Zodape, 2001). نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره جلبکی تأثیر مثبت و معنی داری بر پارامترهای رشدی مرتبط با ریشه چه دارد و استفاده از آن در سطوح ۲/۵ و ۳/۵ درصد بسیار موثرتر است.

- Craigie, J.S.** 2011. Seaweed extract stimulation in plant science and agriculture. – J. Appl. Phycol. 23: 371-393.
- David, C.** 2010. The effect of gibberellins (GA₃ and GA₄) and ethanol on seed germination of *Rosa eglanteria* and *Rosa glauca*. – Plant Growth Regul. 41: 1-10.
- Fabian, A., Jager, K. and Barnabas, B.** 2008. Effects of drought and combined drought and heat stress on germination ability and seminal root growth of wheat (*Triticum aestivum* L.) seedlings. – Acta Bio. Szege. 52: 157-159.
- Farooq, M., Basra S.M. and Ahmad, A.N.** 2007. Improving the performance of transplanted rice by seed priming. – Plant Growth Regul. 51: 129-137.
- Ganze, O.K.U., Mehmet Demir, K.A.Y. and Mehmet, A.T.A.** 2005. Effects of salt and drought stresses on germination and seedling growth of pea (*Pisum sativum* L.). – Turkish J. Agri. 29: 237-242.
- Ghannad, R., Akbari, F. and Madadkar Haghjou, M.** 2017. Effect of blue-green and green algae *Spirulina*, *Chlorella*, *Dunaliella* and minerals on the stimulation of metabolic and biochemical processes of germination in *Dracocephalum kotschy* Boiss. Seeds. – Nova Biol. Reperta 3: 295-307.
- Gunes, A., Cicek, N., Inal, A., Alpaslan, M., Eraslan, F., Guneri, E. and Guzelordu, T.** 2006. Genotypic response of chickpea (*Cicer arietinum* L.) cultivars to drought stress implemented at pre-and post anthesis stages and its relations with nutrient uptake and efficiency. – Plant Soil Environ. 52: 868-876.
- Halmer, P.** 2000. Commercial seed treatment technology. In: Black, M. and Bewley, J. D (Eds.) Seed technology and its biological basis. – Sheffield Academic Press, Sheffield, 257-286.
- Hosseinzadeh, S.R., Amiri, H. and Ismaili, A.** 2016. Effect of vermicompost extract on germination characteristics of chickpea (*Cicer arietinum* L.) under drought stress. – J. Plant Res. 29: 589-598.
- ISTA: International Seed Testing Association.** 2009. International rules for seed testing. – Seed Sci. Tech. 49: 86-41.
- Jannin, L., Arkoun, M., Etienne, P., Laine, P., Goux, D. and Garnica, M.** 2013. *Brassica napus* growth is promoted by *Ascomyllum nodosum*. Seaweed extract: microarray analysis and physiological characterization of N, C, and S metabolisms. – Plant Growth Regul. 32: 31-52.
- Kafi, M., Nezami, A., Hosaini, H. and Masomi A.** 2005. Physiological effects of drought stress by polyethylene glycol on germination of lentil (*Lens culinaris* Medik.) genotypes. – Iranian J. Crops Res. 3: 69-80.
- Kalefetoglu Macar, T., Turan, O. and Ekmekci, Y.** 2009. Effect of water deficit induced by PEG and NaCl on Chickpea (*Cicer arietinum* L.) cultivars and lines at early seedling stage. – J. Sci. 22: 5-14.
- Khalid, M.N., Iqbal, H.F., Tahir, A. and Ahmad, A.N.** 2001. Germination potential of chickpeas (*Cicer arietinum* L.) under saline condition. – J. Bio Sci. 4: 395-396.
- Kord Firouzjaj, G., Habibi, H., Sodai Mashai, S. and Fotoukian, M.H.** 2012. The effect of foliar application of fertilizers containing nutrients and growth stimulants on the germination factors of rice. – J. Sci. Tech. 2: 1-10.
- Kumar, G. and Sahoo, D.** 2011. Effect of seaweed liquid extract on growth and yield of *Triticum aestivum* var. Pusa Gold. – J. Appl. Phyco. 23: 251-255.
- Mensah, J.K., Obadoni, B.O., Eruotor, P.G. and Onome-Irieguna, F.** 2006. Simulated flooding and drought effects on germination, growth and yield parameters of sesame (*Sesamum indicum* L.). – African J. Bio. 5: 1249-1253.
- Michael, B.E. and Kaufman, M.R.** 1976. The osmotic potential of polyethyleneglycol-6000. – Plant Physiol. 51: 914-916.
- Rahbarian, R., Khavari-nejad, R., Ganjeali, A., Bagheri, A.R. and Najafi, F.** 2012. Drought stress effect on germination and seedling for drought tolerance in chickpea genotypes (*Cicer arietinum* L.) under control condition. – Iranian J. Crops Res. 10: 522-531.
- Ramarajan, S., Joseph, L.H. and Ganthi, A.S.** 2012. Effect of seaweed liquid fertilizer on the germination and pigment concentration of soybean. – J. Crop Sci. Tech. 1: 1-5.
- Zakaria, M.S., Ashraf, H.F. and Serag, E.Y.** 2009. Direct and residual effects of nitrogen fertilization, foliar application of potassium and plant growth retardant on Egyptian cotton growth, seed yield, seed viability and seedling vigor. – Acta Eco. Sci. 29: 116-123.
- Zhang, X.E. and Ervin, H.** 2008. Impact of seaweed extract-based cytokinins and zeatin-riboside on creeping bentgrass heat tolerance. – Crop Sci. 48: 364-370.
- Zhang, X.Z. and Ervin, E.H.** 2004. Cytokinin-containing seaweed and humic acid extracts associated with creeping bentgrass leaf cytokinins and drought resistance. – Crop Sci. 44: 1737-1745.
- Zodape, S.T.** 2001. Seaweeds as a biofertilizer. – J. Sci. Indust. Res. 60: 378-382.

How to cite this article:

Ahmadpour, R., Salimi, A., Zeidi, H., Armand, N. and Hosseinzadeh, S.R. 2019. The effects of *Ascomyllum nodosum* extract on the stimulation of germination indices in chickpea (*Cicer arietinum*) under drought stress– Nova Biol. Reperta 6: 206-216.

احمدپور، ر.، سلیمی، ا.، زیدی، ه.، آرمند، ن. و حسین‌زاده، س. ر. ۱۳۹۸. بررسی تاثیر عصاره *Ascomyllum nodosum* بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه نخود در شرایط تنش خشکی. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۶: ۲۱۶-۲۰۶.